

# Allopurinol

bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa



## Informatiefolder

NNIC folder Allopurinol  
uitgave november 2014

Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL artsen binnen respectievelijk het NNIC en het ICC. De folder is ontwikkeld conform NNIC richtlijnen om uniformiteit binnen de voorlichting ten aanzien van IBD patiënten in Nederlandse zorginstellingen na te streven. Op basis van goed hulpverlenerschap kan onder bepaalde omstandigheden van de inhoud worden afgeweken. De inhoud van de folders kan wijzigen in de loop van de tijd. Het NNIC en het ICC wijzen er op dat aan de inhoud van deze uitgave geen rechten of plichten kunnen worden ontleend. Het staat u vrij uw bedrijfslogo te gebruiken naast het NNIC logo.

*Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Allopurinol. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van Allopurinol en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht.*

## **Algemeen en werking**

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontstekingen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet definitief genezen.

Uw behandelend arts heeft u eerder azathioprine (Imuran®) of mercaptopurine (Puri-nethol®) voorgeschreven. In het bloed is opgemerkt dat het middel niet juist wordt omgezet. Als gevolg van deze onjuiste omzetting kan er bij u onvoldoende spiegel van de werkzame stof worden opgebouwd. Uw lichaam zet het middel om in een afbraakproduct wat op de langere tijd bijwerkingen kan veroorzaken. Dit kan gecorrigeerd worden door toevoeging van het middel Allopurinol, een medicijn wat vooral bij de behandeling van jicht wordt toegepast. Door gelijktijdig gebruik van Imuran®/Puri-Nethol® en Allopurinol stijgt de spiegel en daalt het afbraak product. Doordat Allopurinol de afbraak van Imuran®/Purinethol® beïnvloedt moet de dosis van deze middelen worden verlaagd. Tevens dient net als bij het starten van Imuran®/Puri-Nethol® het bloed na toevoeging van Allopurinol in de eerste weken extra gecontroleerd te worden. Daarnaast kan Allopurinol bijwerkingen geven.

## **Bijwerkingen**

Bijwerkingen die bij Allopurinol voorkomen zijn:

Vaak (1–10%): allergische huidreacties zoals huiduitslag.

Soms (0,1–1%): maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken (te verminderen door inname na de maaltijd).

Zelden (0,01–0,01%): overgevoeligheidsreacties. Zie bijsluiter

Zeer zelden (< 0,01%): zie bijsluiter.

In verband met mogelijke bijwerkingen zal regelmatig uw bloed worden gecontroleerd. Hierover licht uw IBD verpleegkundige of IBD arts u in.

## **Gebruik**

Allopurinol is verkrijgbaar in tabletvorm. De voorgeschreven dosering moet zeer strikt aangehouden worden. De dosering van Imuran®/Puri-Nethol® moet altijd worden aangepast. Over het algemeen wordt het gebruik van allopurinol goed verdragen.

### **Vruchtbaarheid en zwangerschap**

Allopurinol lijkt geen invloed te hebben op de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen.

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik tijdens een zwangerschap. Licht uw behandelend arts of verpleegkundige tijdig in dat u een zwangerschapswens heeft en deze middelen gebruikt.

### **Borstvoeding**

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de veiligheid van allopurinol bij het geven van borstvoeding.

### **Registratie**

Allopurinol is onder andere geregistreerd voor de behandeling van Jicht. Vandaar dat u in de bijsluiter adviezen zult aantreffen die niet terug te vinden zijn in deze folder en ook niet van toepassing zullen zijn op uw situatie. Mocht u daardoor toch nog vragen hebben neem dan contact op met uw behandelend arts of verpleegkundige.

### **Griepvaccinatie**

Omdat u door de behandeling met Azathioprine (Imuran®)/mercaptopurinol (Puri-Nethol®) en Allopurinol gevoeliger bent voor infecties komt u in aanmerking voor griepvaccinatie via uw huisarts.

### **Tot slot**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw IBD verpleegkundige.